

Cuestionario sobre uso del “Sistema de Fichas Farmacológicas” en la asignatura *Pacticum I*

Apartado 2: Valoración de Conocimientos

1. Un error es un incumplimiento deliberado y sistemático de las normas y reglas de la atención sanitaria:

- A. Verdadero
- B. Falso

2. ¿Cuál/es de los siguientes factores piensas que pueden facilitar la aparición de errores por comisión u omisión?

- A. Recurrir a la memoria
- B. Procedimientos de trabajo no normalizados
- C. Sobrecarga de trabajo
- D. Todos los anteriores

3. Señala la afirmación incorrecta sobre los incidentes con medicamentos:

- A. Se refieren a los accidentes, problemas o sucesos que pueden aparecer ante el uso de medicamentos.
- B. Los acontecimientos adversos potenciales no se pueden prevenir, aunque afortunadamente no conllevan daño para el paciente.
- C. Son inesperados y no deseados.
- D. Pueden aparecer por error o sin error y pueden causar, o no, daño en el paciente.

4. Las reacciones adversas a medicamentos:

- A. Son Evitables
- B. Son un riesgo inherente de los medicamentos y por tanto no son evitables

5. El daño sufrido por el paciente como consecuencia de la medicación que recibe sin que medie ningún tipo de error:

- A. No se considera como incidente con medicamentos
- B. Es una reacción adversa
- C. Es un acontecimiento adverso prevenible
- D. Ninguna es cierta

6. ¿Cuál es el antídoto específico para la intoxicación por Paracetamol?

- A. Naloxona (Naloxone ®)
- B. Carbón activo o antídoto universal (Carboliq ®)
- C. Acetilcisteína (Flumil Antídoto ®)
- D. Flumazenilo (Anexate ®)

7. La administración IV directa en bolo rápido (menor a 5 min) de Furosemida (Seguril ®) puede provocar:

- A. Hipotensión
- B. Ototoxicidad
- C. Hipertensión craneal.
- D. Xerostomía (sequedad de boca)

8. ¿Cuál de estas reacciones adversas no es propia de la Morfina?

- A. Estreñimiento.
- B. Bradicardia.
- C. Sialorrea (aumento de la secreción salivar).
- D. Náuseas y vómitos.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Cloruro Potásico (ClK) no es cierta?

- A. A velocidad superior a 20 mEq/h por vía central o 10 mEq/h por vía periférica puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco.
- B. El ClK es un fármaco necrosante.
- C. La administración de ClK está contraindicada durante el embarazo.
- D. La administración de ClK solo se realizará en perfusión continua o intermitente, nunca en administración IV directa.

10. En general la administración de antibióticos mediante perfusión IV continua:

- A. Es adecuada
- B. No es conveniente o está contraindicada

11. Si administramos metamizol (Nolotil ®) por vía IV directa en bolo rápido (velocidad superior a 1 ml/min) es frecuente la aparición de:

- A. Disnea
- B. Bradicardia
- C. Hipotensión
- D. Náuseas y vómitos

12. Señala la afirmación incorrecta sobre ciprofloxacino (Baycip ®):

- A. No es necesario inspeccionar visualmente la solución para perfusión antes de su administración.
- B. La perfusión se hará de forma lenta en venas de gran calibre para evitar la tromboflebitis.
- C. Salvo que su compatibilidad esté demostrada, se administrará siempre por separado
- D. Los sueros compatibles son SF, SG y suero glucosalino. Para disolver en otros líquidos de perfusión comprobar siempre su compatibilidad.

13. En la administración parenteral de paracetamol es cierto que:

- A. Paracetamol puede mezclarse con otros medicamentos
- B. Para evitar errores de dosificación debido a la confusión entre miligramos (mg) y mililitros (ml), que podrían producir sobredosis accidental y muerte, la dosis total deberá estar expresada como dosis total en mg y como dosis total en volumen.
- C. La solución de paracetamol puede administrarse en forma de bolo IV directo.
- D. En administración IV rápida es frecuente la aparición de hipotensión

14. Sobre metoclopramida (Primperan ®) para administración parenteral es cierto que:

- A. Se puede administrar por vía IM e IV.
- B. Para administrar en perfusión IV intermitente diluir con 50-100 ml de SF o SG5% y pasar en al menos 15 min.
- C. Entre las soluciones compatibles están SF, SG, suero glucosalino y Ringer-Lactato.
- D. Todas las anteriores son ciertas para metoclopramida.

15. Sobre omeprazol (Losec ®) para administración parenteral, señala la respuesta correcta:

- A. El contenido íntegro de cada vial debe disolverse en aproximadamente 5 ml y diluirse inmediatamente después hasta 100 ml.
- B. La estabilidad en SF y en SG es limitada y no debe disolverse en otras soluciones.
- C. Una vez preparada, la solución debe administrarse en un periodo de 20 a 30 minutos.
- D. Todas las anteriores son ciertas